

Kumańska

— MIKROPIGMENTACJA —

Jakie są przeciwwskazania do wykonania zabiegu mikropigmentacji?

Zabieg makijażu trwałego nie może zostać wykonywany, jeśli u Klientki występuje którekolwiek z wymienionych przeciwwskazań:

- Infekcje bakteryjne, wirusowe lub grzybicze, (w tym opryszczka – minimum 3 tygodnie po zagojeniu można wykonać zabieg),
- Uszkodzenia skóry w miejscu pigmentowania,
- Ciąża i okres laktacji,
- Radio- i chemioterapia,
- Półpasiec,
- Świeże blizny,
- Poparzenie słoneczne,
- Opalenizna - minimum miesiąc po zaprzestaniu kąpieli słonecznych,
- Stany zapalne,
- Wybroczyny skórne,
- Obniżenie odporności organizmu,
- Infekcje,
- Stany podgorączkowe,
- Reakcje alergiczne na barwniki,
- Nowotwory,
- Hemofilia,
- Choroby skórne na powierzchni pigmentowanej (m.in. łuszczyca, pokrzywka, bielactwo),
- Choroby serca,
- Wykwity skórne,
- Choroby siatkówki i rogówki oka,
- Epilepsja,
- Zażywane leki: uspokajające, nasenne, przeciwzakrzepowe, sterydowe (utrudniają gojenie), przeciwzapalne, antydepresyjne, grzybobójcze i antybiotyki,
- Cukrzyca (jeśli jest wyrównana - można wykonać zabieg),
- Stosowanie retinoidów (min. po pół roku można wykonać zabieg),
- Alergia na preparaty znieczulające,

- Choroby gałki ocznej,
- Przebyte zabiegi operacyjne w przypadku pigmentacji powiek,
- Odżywki stymulujące porost włosów,
- Zabiegi złuszczające ok. 4 tygodnie,
- Zabiegi laserowe ok. 4 tygodnie,
- Zabiegi z użyciem toksyny botulinowej (min. 4 miesiące),
- Stosowanie henny kosmetycznej (ok. 3 tygodnie), w tym henny pudrowej (okres ok. 3 miesiące),
- Laminacja rzęs i brwi (w tym farbka lub henna),
- Sztuczne rzęsy - należy je zdjąć ok. tydzień przed planowym zabiegiem kreski permanentnej,
- Przed planowanymi operacjami minimum pół roku,
- Po plastyce powiek górnych, dolnych oraz liftingu należy odczekać minimum 6 miesięcy i/lub po uzyskanej zgodzie lekarza,
- Uszkodzenia skóry w miejscu pigmentacji,
- Inne niewymienione choroby skóry,
- Trądzik w tym trądzik różowaty,
- Stosowanie szkieł kontaktowych (w przypadku pigmentacji powiek należy przyjąć w okularach),
- Szczepienia - w tym przeciwko Covid minimum 3 tygodnie po zaszczepieniu,
- Wykonywanie innych zabiegów inwazyjnych związanych z przerwaniem ciągłości skóry (lasery, iniekcje, wypełniacze, stymulatory tkankowe itp.) odstęp minimum miesiąca,
- Spożywanie alkoholu, narkotyków, dopalaczy.